


¿Cómo se transmite el virus del Zika?

El virus Zika se transmite principalmente por la picadura de mosquitos *Aedes*, los mismos que transmiten el dengue y el chikungunya. También puede transmitirse de una madre embarazada a su bebé durante el embarazo o en el momento del nacimiento. No sabemos con qué frecuencia el Zika se transmite de madre a hijo durante el embarazo o al nacer.

¿Cuáles son los síntomas de la infección por Zika?

Alrededor de una de cada cinco personas infectadas con Zika se enfermarán. Para las personas que se enferman, la enfermedad suele ser leve. Por esta razón, muchas personas pueden no darse cuenta de que han sido infectadas. Los síntomas más comunes de la enfermedad del virus del Zika son fiebre, sarpullido, dolor en las articulaciones, o conjuntivitis no purulenta (ojos rojos). Los síntomas generalmente comienzan de 2 a 7 días después de haber sido picado por un mosquito infectado.



¿Quién está a riesgo de ser infectado?

Cualquier persona que viva en o viaje a un área donde se encuentra el virus del Zika que aún no haya sido infectado con el virus está a riesgo de infección, incluyendo las embarazadas.

Estoy embarazada. ¿Cómo va el virus del Zika afectar mí o a mi bebé?

En Brasil se ha visto un aumento en el número de defectos congénitos de microcefalia en los bebés de madres que pudieron haber sido infectadas con el virus del Zika durante el embarazo. Sin embargo, se necesitan estudios adicionales para caracterizar mejor esta relación. Se están llevando a cabo más estudios para obtener más información sobre los riesgos de infección por el virus Zika durante el embarazo.

En Puerto Rico, al momento sólo se ha detectado un puñado de casos de Zika en la zona este del país. Hasta que se conozca más sobre esta situación, y como medida de precaución, el Departamento de Salud de Puerto Rico y los CDC están recomendando precauciones especiales para las mujeres embarazadas y las mujeres que están buscando quedar embarazadas.

¿Qué puedo hacer para protegerme durante el embarazo?

Evite las picaduras de mosquitos durante el embarazo, es importante para disminuir el riesgo de daño a su bebé por infecciones con dengue, chikungunya o Zika. El dengue, chikungunya y Zika es transmitido por la picadura del mosquito *Aedes aegypti*. Una mujer embarazada infectada con cualquiera de estos tres virus infectar a su bebé antes de nacer o su bebé recién nacido y como en el caso de infecciones con Zika podría haber un vínculo con defectos congénitos como la microcefalia.

¿Es seguro usar un repelente de insectos si estoy embarazada o amamantando?

¡Sí! El uso de un repelente de insectos es seguro y eficaz. Las mujeres y las mujeres que están amamantando pueden y deben elegir repelentes de insectos registrados por la EPA, usarlos de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

